

NOVINKA

NÁSTRAHA K HUBENÍ ŠKODLIVÝCH HLODAVCŮ

STOPRATOX



VÝRAZNÉ AROMA
KVALITNÍ SUROVINY
S ATRAKTIVNÍ RYBÍ MOUČKOU
ODOLNOST PROTI VLHKU

Požerová nástraha ve formě červeně zbarvených pelet k hubení škodlivých hlodavců jako je potkan, krysa, myš domácí a hryzec vodní v uzavřených objektech jako jsou chaty, kolny, bytové prostory, sklepy, půdy a jejich nejbližší okolí. Speciální úprava nástrahy ji předurčuje k použití i ve vlhkém prostředí. Nástraha má zvýšenou odolnost vůči plísni. Její výrazné aroma je pro hlodavce neodolatelné.

✓ Složení:

0,005% bromadiolone (tj. 0,05 g v 1 kg), 99,995% atraktanty a pojidla

Pozor! Jed na potkany, krysy, myši domácí! Obsahuje vysoce toxický antikoagulant bromadiolon!

R 55: toxický pro živočichy, S 2: uchovávejte mimo dosah dětí, S 13: uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, S 20/21: nejezte, nepijte a nekuřte při používání, S 26: při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 28: při styku s kůží omyjte okamžitě velkým množstvím vody, S 37: používejte vhodné ochranné rukavice, S 46: při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tuto etiketu. Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu k použití! Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata! Nesmí být použit ve volné přírodě!

✓ Vlastnosti:

Stoprattox je antikoagulantní rodenticid druhé generace. Působí i na populace rezistentní vůči antikoagulantům první generace. Působí na hlodavce smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Hlodavci je nástraha velmi dobře přijímána.

✓ Mechanismus účinku:

Stoprattox snižuje srážlivost krve u hlodavců a zvyšuje propustnost krevních cest, což vede k zevnímu i vnitřnímu krvácení a posléze k uhybnutí. Dávkování a způsob použití: Nástraha se pokládá na místa největšího výskytu hlodavců, zejména do blízkosti východů z nor, k obvyklým zdrojům potravy a vody a podél přístupových stezek k nim. Nástrahy pokládat do jedových staniček. Nástrahu je nutno doplňovat tak dlouho, pokud trvá její odběr. Nespotebované zbytky nástrahy je nutné neškodně odstranit.

✓ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při kladení používat vhodné ochranné rukavice. Při práci není dovoleno jíst, pít, kouřit. Po práci je nutno se umýt vodou a mýdlem. Příznaky otravy: Krátce po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice a krvácení z nosu a dásní.

✓ První pomoc:

Při požití vypít asi půl litru vlažné vody s deseti tabletami medicínálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení. Při zasažení očí vymývat 10–15 minut proudem čisté vlažné vody. Pokožku důkladně omýt vodou a mýdlem. Postiženého s informací o přípravku a o poskytnuté první pomoci předat k dalšímu ošetření lékaři. Antidotem v případě otravy je vitamin K1, jehož dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možno konzultovat s toxikologickým informačním střediskem v Praze: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko, Na bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93.

✓ Skladování:

Stoprattox se skladuje odděleně od potravin, nápojů, krmiv a chemických látek. Pachy z těchto látek mohou negativně ovlivnit přijímání nástrahy hlodavci. Prázdný obal od přípravku uložit do komunálního odpadu.

✓ Minimální doba použitelnosti:

24 měsíců od data výroby v původních neotevřených obalech



Balení: 1Kg, 5Kg, 25Kg

Pelety průměr 3 mm, 6 mm, 12 mm

Datum výroby: uvedený na obale

Výrobce: MIKROP ČEBÍN a.s., Čebín 416, PSČ 664 23, tel.: 602 570 723

Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120 / 2002 Sb. Č.j. REG 37072/2009-SOZ-33.5-19.08.09.

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 75/2009 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.